

日本漢方協会通信

25年 4月②

国内副作用報告の状況 一般用・漢方関係抜粋 平成24年8月～11月
厚生労働省ホームページ審査会資料

| | | | | | |
|----------|--|-------------|---|-----|------|
| 止しゃ剤、整腸剤 | 18錠中アクリノール120mg, タンニン酸ペルペリン180mg, ウルソデオキシコール酸30mg, ゲンノショウコエキス末250mg(ゲンノショウコ1.5g), ロートエキス3倍散135mg | アナフィラキシー反応 | 1 | 第二類 | 不明 |
| 健胃消化剤 | 4包(12g)中ガジュツ末1000mg, 真昆布末400mg | アナフィラキシー様反応 | 1 | 第二類 | 不明 |
| 下剤、浣腸剤 | 1錠中ピサコジル5mg | 虚血性大腸炎 | 1 | 第二類 | 店舗販売 |
| | 1錠中大黄甘草湯エキス散200mg(ダイオウ267mg, カンゾウ67mg) | 房室ブロック | 1 | 第二類 | 不明 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|--------|----------------|----------|
| 混合ビタミン剤(ビタミンA・ビタミンD混合製剤を除く) | 人参エキスP 54.1mg (ニンジン600mg), ローヤルゼリーテンキ 200mg (ローヤルゼリー 200mg), ロクジョウテンキ 51.6mg (鹿茸 14.45mg), ゴオウテンキA 100mg (ゴオウ 1mg), テアミン硝酸化物(ビタミンB1) 5mg, リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 3mg, ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 5mg, ニコチン酸アミド 20mg, 無水カフェイン 40mg, イノシトール 100mg, タウリン 1500mg | アナフィラキシーショック | 1 | 第三類 | 不明 |
| | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 100mg, ローヤルゼリー 200mg, 肝水解毒 50mg, ニンジン乾燥エキス 70mg (紅参700mg), 酢酸α-トコフェロール 100mg, ゴオウ 4mg, ビスベンテアミン 25mg (テアミン塩化物塩酸塩21.9mg) | 急性肝炎 | 1 | 第三類 | 店舗販売 |
| その他の滋養強壮薬 | 4カプセル中ゴオウ100mg, ニンジン600mg, ニンジン粗エキス末300mg(ニンジン900mg) | 喘息 | 1 | 第三類 | 店舗販売 |
| 総合代謝性製剤 | 2錠中 エソウコギ乾燥エキス 12mg (エソウコギ300mg), オウギ乾燥エキス 30mg (黄耆240mg), オキソアミチン末 50mg, L-アルギニン塩酸塩 50mg, テアミン硝酸化物10mg, リボフラビン4mg, ビリドキシン塩酸塩 10mg, トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 20.7mg (トコフェロールコハク酸エステル20mg), L-アスコルビン酸ナトリウム 112.6mg (アスコルビン酸100mg), ニコチン酸アミド 25mg, 無水カフェイン 50mg | ステイプルス・ジョンソン症候群 | 1 | 第三類 | 不明 |
| 生薬 | 葛根湯水製抽出エキス(乾燥) 5.56g (カッコン8g, マオウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シヤクヤク各3g, カンゾウ2g, ショウキョウ1g) | 中毒性皮疹 | 1 | 第二類 | 不明 |
| | 4カプセル中ロクジョウ・カイバトチュウ・アキョウ各67mg, コウクジン・ケイヒ各53mg, トウキ・ニンジン各133mg, コクロジン235mg, ボタンビ33mg, 水性エキス818mg(センボウ・トシシ・ホコソシ・コロハ・ハゲキテン・ニクジュヨウ・サヨウ・フクボシ・ホウブシ・ゲンジン・ビヤクジュツ・サンシユウ・バクモンドウ各67mg, インヨウカク・ジュクジヨウ・クコシ・オウギ・ブクリョウ各133mg, センゾクダン・ゴシツ・カンゾウ各33mg) | 肝機能検査異常 幻覚 | 1 1 | 指定第二類 指定第二類 | 不明 不明 |
| | 辛夷清肺湯エキス粉末 2,500mg <原生薬換算量> シンイ 1.5g, オウゴン 1.5g, セッコウ 3.0g, テモ 1.5g, サンシシ 0.75g, ショウマ 0.75g, ビヤクゴウ 1.5g, バクモンドウ 3.0g, ビヨウ 0.5g | 間質性肺疾患 | 1 | 第二類 | 不明 |
| | 乾燥エキス 2.25g (サイコ2.5g, ハンゲ2g, ケイヒ・ブクリョウ各1.5g, オウゴン・タイソウ・ニンジン・ホレイ・リュウコツ各1.25g, ショウキョウ0.5g) | 間質性肺疾患 | 1 | 第二類 | 店舗販売 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--------|------------|----------|
| 漢方製剤 | 12錠中防風通聖散料乾燥エキス 2.50g (ポウフウ・センキョウ・シヤクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビヤクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g) | 肝機能異常 間質性肺疾患 | 1 1 | 第二類 第二類 | 不明 不明 |
| | 防風通聖散料エキス粉末 2,850mg (トウキ・シヤクヤク・センキョウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.6g, ビヤクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1.0g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.5gより抽出。) | 紅斑性皮疹 | 1 | 第二類 | 不明 |
| | 12錠中防風通聖散料製乾燥エキス3g(トウキ・シヤクヤク・センキョウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.6g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ・硫酸ナトリウム各0.75g, ビヤクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, カッセキ1.5g) | 黄疸 肝機能異常 | 1 1 | 第二類 第二類 | 不明 不明 |
| その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 | 3包(4.5g)中痛散湯水製乾燥エキス0.5g(マオウ0.7g, キョウニン・カンゾウ各0.5g, ヨクイニン1.3g, ボウイ2g, 動物胆0.1g), マオウ0.6g, ヨクイニン末1.4g, カンゾウ末0.4g, ボウイ末1.6g | 偽アルドステロン症 | 1 | 指定第二類 | 通信販売 |
| 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | 1枚(20cm2)中ニコチン35mg | 視力障害 | 1 | 第一類 | 店舗販売 |
| | 1個中 ニコチン2mg | 下痢 | 1 | 指定第二類 | 不明 |
| | | 腸出血 | 1 | 指定第二類 | 不明 |
| | ニコチン 2mg | 筋痙攣 | 1 | 指定第二類 | 不明 |

薬局製剤改訂

厚生省ホームページに「薬局製剤改訂」のパブリックコメントが掲載されました。漢方薬に関しては、基準書(210処方)が改訂されたこと、局方・局方外生薬規格の改定が行われていることより、全製品の改訂が行なわれます。210処方の改訂は4回行われましたが、今回の薬局製剤の改訂は、3回までの改訂と新収載が行われています。パブリックコメント終了後に日本薬剤師会から薬局製剤改訂のアクションがある予定です。

日本漢方協会の講師団長が交代いたします。

長年にわたって、山田光胤先生に講師団長をお願いしてきましたが、先生からのお話で、秋葉哲生に交代していただくことになりました。